

## Ein weiterer Beitrag zu den Thorakalstigmata von Satyrinae-Puppen

(Lepidoptera, Nymphalidae)

von

ULF EITSCHBERGER

eingegangen am 19.VII.2008

**Zusammenfassung:** In Ergänzung zu der Arbeit von EITSCHBERGER & WAGENER (1994) werden die Thorakalstigmata, und Detailvergrößerungen derselben, von *Melanargia titea wiskotti* RÖBER, 1896 abgebildet.

**Abstract:** In addition to EITSCHBERGER & WAGENER (1994), SEM-micrographs of the “thoratic stigmata” are figured of *Melanargia titea wiskotti* RÖBER, 1896.

*Melanargia titea wiskotti* RÖBER, 1896 ist in ihrem Fluggebiet auf den Kilikischen Taurus in der Türkei beschränkt (HESSELBARTH, OORSCHOT & WAGENER, 1995). Das Material für diese Bilder stammt von Puppen, die mir der verstorbene Freund P. Dr. SIGBERT WAGENER zur Verfügung gestellt hat und die dieser aus Eiern, von einem ♀ bei Demircilli, nahe Silifke, e. o. 1983/ 84, gefangen, aus Eiern gezüchtet hat.

Die sogenannten Thorakalstigmata wurden in EITSCHBERGER & WAGENER (1994: 183-190) genau beschrieben - auch über deren Funktion diskutiert. In Anlehnung an diese Arbeit sollen hier weitere Bilder über dieses noch rätselhafte Organell von *Melanargia titea wiskotti* RÖBER, 1896 hinzugefügt werden. Ein Vergleich dieser Abbildungen mit denen von *M. meadewaldoi* ROTHCHILD 1917 in EITSCHBERGER & WAGENER (1994: 185-187) läßt doch deutliche Unterschiede bei den Setae erkennen. In Ergänzung hierzu bei den Sphingidae der Westpalaearktis siehe auch in DANNER, EITSCHBERGER & SURHOLT (1998, 1 (1): 14, 15; 1 (2): 700-719).




Abb. 1: *Melanargia titea wiskotti* RÖBER, 1896, Türkei, Demircilli, nahe Silifke, e. o. 1983/ 84, P. Dr. S. WAGENER leg. Gesamtansicht des Organells mit Detailvergrößerung.






Abb. 2-5: *Melanargia titea wiskotti* RÖBER, 1896, Türkei, Demircilli, nahe Silifke, e. o. 1983/ 84, P. Dr. S. WAGENER leg. Gesamtansicht des Organells mit Detailvergrößerungen.